

醫

學

綱

目

小兒初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便乳食不消或白色是傷寒當下之併和胃下用白餅子和胃用益黃散主之

兒生三日已上至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便青白色乳食不消此上實下虛也更有五臟兼見證 肺睡露睛喘氣 心驚悸飲水 脾困倦饒睡 肝呵欠煩悶 腎不語畏明 當先視兒兼臟症先瀉其所實者而補其虛如脾虛益黃散主之此二症多病於秋夏也

五月身熱瀉黃九分下一分補

五月夏至後吐瀉身壯熱者此熱也蓋小兒臟腑十分中九分熱也或因傷熱乳食不消瀉深黃色玉露散主之

玉露散一名甘露散

寒水石

半兩軟而微青黑中有細紋者

生甘草

錢一

石膏

半兩堅白而有

墻壁手不可折者如無以方解石代之堅白似石膏敲之段段皆方者是

右同爲細末每服一字或五分一錢食後溫湯調下

云非腎熱相火太盛者不宜服此

六月身溫瀉黃

白色六分補四分下

六月大暑後吐瀉身大溫而似熱臟腑中六分熱四分冷也吐嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不食乳食前少服益黃散食後多服玉露散 廣親宮五太尉病吐瀉不止米穀不化衆醫用溫藥一日而加喘吐不定錢氏曰當以涼藥治之所以然者謂傷熱在內也用石膏湯三服并服之衆醫皆言吐瀉多而米穀又不化當補脾何以用涼藥王信衆醫皆用補脾丁香散三服錢醫後至曰不可服此三日後必腹滿身熱飲水吐逆三日外果如所言所以然者謂六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾胃即大吐瀉也醫又行溫藥使上焦亦熱故喘而引飲三日當甚衆師不能治復召錢至見其熱證以白虎湯三服更以白

餅子下之一日減藥二分二日三日又與白虎湯各二服

四日用石膏湯一服及旋合麥門冬黃芩腦子牛黃天竺

黃茯苓以硃砂爲衣服五九竹葉湯化下熱退而安

七月瀉
身溫涼

七月立秋後吐瀉身溫臟腑中三分熱七分冷也不能食

三分下
七分補

乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛唇白多噦欲大便不

渴食前多服益黃散食後少服玉露散 廣親宮七太尉

七歲病吐瀉是時七月其症全不食而昏睡睡覺而悶亂

哽氣乾嘔大便或有或無不渴衆醫作驚治之疑睡故也

錢曰先補脾後退熱與史君子丸補脾石膏湯退熱次日

又以水銀硫黃末研和以生薑水調下一字錢曰凡吐瀉

五月內九分下而一分補八月內九分補而一分下此者

是脾虛瀉醫妄治之至於虛損下之卽死卽當補脾若以

史君子丸恐緩已又留溫胃益脾藥治之醫者李生曰何

食而噦錢曰脾虛津少即嘔逆曰何瀉青楊水曰腸胃至
虛冷極故也錢治而愈

六月身
公瀉青

一分下
九分補

下後不
愈通証
用藥

八月秋分後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾嘔噦瀉青楊
水當補脾益黃散主之不可下也

四凡小兒盛暑吐瀉邪熱在下焦則瀉在上焦則吐上津
必渴用玉露散雖吐時時與啜之過三日必愈 如身熱

脈大小便黃用五苓益元各半熱湯調溫服之 如身涼
脈細小便青早晨益黃散午後玉露散 如過四五日困

弱宜異功散和中丸開胃丸

五如有風而瀉用防風羌活 謂吐瀉兼肝病 風搐拘急也 有熱而瀉

用黃連黃芩大黃 謂吐瀉兼心 病身熱也 有寒而瀉用附子 謂吐瀉兼

腎病身冷或足 有濕而瀉用白朮茯苓 謂吐瀉兼本藏 脾病多腫體重

昏倦也 有肺病而瀉用芍藥桂心定喘麥冬人參甚者多

檳榔大便不通加大黃謂以瀉兼肺病喘嗽也更詳看病新舊新

則止之久則有腸風之患宜推陳致新法宜風散導過

後用入臙君臣藥調之宜益黃散

之春治傷寒吐瀉身温乍凉乍熱睡多氣麓大便黃白色嘔吐

身熱瀉黃白咳乳食不消時咳嗽更有五臟兼見症當煎入臙君臣藥先

後瀉服大青膏後服益黃散如先曾下或無下證慎不可下此

乃臙肺受寒不能入臙也潔古云身温吐瀉咳嗽是風木入於臙母虛其子亦弱法當煎

檳榔荳蔻湯下大青膏後服益黃散

身熱瀉黃而瀉傷風吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水此

先止瀉後去為胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴止後用發

散藥止渴多服白朮散發散大青膏主之潔古云吐瀉身熱而渴小便少

者五苓散主之身熱而嘔者當服白朮散後煎檳榔木香湯下大青膏

身涼瀉青不瀉傷風吐瀉身凉吐沫瀉青白色悶亂不渴噎氣長出氣睡

先補後表

露睛此傷風荏苒輕怯因成吐瀉當補脾後發散補脾益

黃散發散大青膏主之此二證多病於春冬也潔古云身

瀉者則知為寒煎附子桂枝湯下大青膏

先表不解者利

小兒傷於風冷病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不已復以涼

之後補

藥治之又不能散謂之本傷風醫者亂攻之因脾氣積虛

內不能散外不能解至十餘日其証多睡露睛身溫風在

脾胃故大便不聚而為瀉當去脾間風風退則痢止宣風

散主之後用史君子丸補其胃亦有諸吐痢久不瘥者則

脾虛生風而成慢驚矣

吐瀉過多脾胃虛乏欲生風候者四君子加白附子減

半生薑煎服

玉露散方見

為熱

和中散和胃止吐瀉定煩渴治腹痛

人參

茯苓

白朮

甘草

乾葛

黃芪

白蘆豆

藿香

右為細末每服三錢水一盞半末二枚去核生薑五片

煎八分食前溫服

海藏云和中散四君子湯加減法

四小兒周歲吐乳腹瀉

滑石

煨二錢

白朮

炒三錢

乾葛

一錢

陳皮

分三

右為籠末煎飲之

吐瀉身熱瀉黃多渴錢氏作熱病治在夏秋用玉露散兼

益黃散相間服在春冬用白朮散大青膏亦相間服

肢冷瀉青不渴

四萬安膏

方見吐瀉

四吐利四肢脹逆腦門低陷四君子加藿香丁香芍藥等

分煎服○錢氏益黃散

方見小兒大法條

四和胃丸治吐瀉不止欲生慢驚

丁香

白木各一兩

半夏五錢

藿香

蝎尾各一錢

右為末薑汁打糊為丸如小豆大三歲兒三十九薑湯下

調理中丸治吐利不歇米穀不化手足厥冷方見傷寒

金液丹治吐利日久脾胃虛損手足厥冷精神昏塞多睡露睛口鼻氣涼欲成慢驚風又治大人陽虛陰盛身冷脈微自汗吐利小便不禁

船上硫黃十兩先飛煉去砂石秤研為末用砂盒子盛令八分蒸水和赤石脂泥固封晒乾露地先埋一水礮盛水滿坐盒子在上又以泥固濟乾常以三斤火養二日三夜足加頂火一斤煨成冷取

右以柶木搥乳鉢研為末每服二錢生薑米飲調下多服取效大人藥末一兩蒸餅一兩水浸去水餅和丸桐

子大晒乾每服五七九至百九米飲空心下

關氏云吐瀉虛極當速生胃氣宜與理中丸併研金液丹末煎生薑米飲調灌之惟多服乃效俟胃氣已生手足漸熱然猶瘳癢即減金液丹一二分增青州白丸子一二分同研如上服兼用異功散羌活膏溫白丸釣藤飲子之類仍類與粥雖至危者往往死中得生十救八九沈存中論金液丹見小兒吐利劇氣已絕服之得活者數人須多服方驗

芫薹散治吐瀉煩渴腹脹小便少

舶上硫黃一分滑石五分

丁香

芫薹各半

右為細末每服一字至半錢米飲調下無時

芫薹散治虛寒而渴方見本條

白朮散治虛熱而渴方見下吐條

吐瀉身溫瀉黃白似渴錢氏作寒熱雜合病治在夏秋用

玉露散益黃散相間服在冬春用益黃散大青膏相間服

之

虛

異功散溫中和氣治吐瀉不思乳食凡小兒虛冷病先

與數服以正其氣一方加木香

人參

茯苓

白朮

甘草

陳皮各等分

右為細末每服二錢水一盞生薑五片葱二枚同煎海

云此方四君子湯補脾湯加減法也

溫中丸治小兒瀉白胃寒故也腹痛腸鳴吐酸水不思飲

食霍亂吐瀉

人參

白朮

甘草各等

右為末薑汁麪糊丸如菽荳大米飲下二三十九無時

吐瀉昏睡露睛者胃虛熱吐瀉昏睡不露睛者胃實熱

虛熱
實熱

胃虛熱治法錢氏白朮散和中散是也胃實熱治法錢氏玉露散河間益元散是也

寒痰 半粟散治小兒脾胃虛寒吐瀉等疾及治寒痰

半夏湯浸切陳粟米陳梗米亦得用三分

右咬咀每服三錢水一大盞半生薑十片同煎至八分

食前溫服

四白附丸方見上脾主濕條 錢氏吐瀉乳不化傷食也宜下之

乳不化 傷食 微瀉清 之其則 上之 馮承務十五歲吐瀉壯熱不思食飲錢氏見兒目中黑睛

少而白睛多面色眇白曰此子必多病面色眇白者神怯也黑睛少者腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱長成必肌膚不壯不奈寒暑易虛易實脾胃亦怯更不可縱恣酒慾若不保養不過壯年也面上常無精神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷食也又虛怯不可

下下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛但宜以消積丸磨化之為微有食也如傷甚則可下不下則成癖也若實食在內亦可下也下畢補脾必愈隨其虛實無不效者

丹小兒吐瀉黃疸

三稜

蓬朮

陳皮

青皮

神麩

麥芽

黃連

甘草

白朮

茯苓

右為細末生薑燈心湯調服傷乳食吐瀉加山查時氣吐瀉加滑石發熱加薄荷

吐

虛
丹萬安膏調脾順氣定驚脾胃不足吐乳黃疸治小兒一切等疾

木香錢二

沉香錢二

檀香錢二

香附兩一

檳榔兩半

白朮兩二

肉寇兩半

薄荷兩二

人參兩半

甘草兩二

辰砂錢三

琥珀

真珠

青黛

犀角各二錢半

黃芪兩一

麝香五分

史君子兩一

天竺黃兩半

右為末煉蜜九臨臥服薄荷汁或蜜水米飲化下

萬安膏治小兒脾胃虛弱腹生疳虫癥瘕食積泄瀉常服消疳去積助胃氣和中疎氣滯

服消疳去積助胃氣和中疎氣滯

人參兩一

木香

沉香

藿香各半兩

厚朴薑製

甘草兩半

陳皮

青皮

乾薑

肉桂冬一兩夏不用

史君子兩一

澤瀉冬不用春秋用

半兩

右為末煉蜜九如芡實大食前米飲化下如熱薄荷湯

下一方無木香沉香藿香青皮四君子有白朮蒼朮茯苓

苓猪苓

錢吐沫及痰或白綠水皆胃虛冷吐稠涎及血皆肺熱久則虛吐痰涎冷者溫之

寒吐

回朱沉丹治小兒嘔吐不止

硃砂

二錢半

沉香

二錢

藿香

三錢

滑石

半兩

丁香

粒

右為細末每服半錢用新汲水一盞麥麻油滴成花子抄藥在上須臾墜瀟去水却用別水空心送下

定吐紫金核治小兒一切嘔吐不止

半夏

湯洗七次

人參

白朮

木香

丁香

藿香

各二錢半

右為細末稀麪糊為丸如李核大後用沉香一錢為末

硃砂一錢水飛二味同研勻為衣陰乾每服一九用小
棗一枚去核納藥在內濕帛裹燒熟嚼與小兒服後以
米飲壓之

香銀丸治吐

丁香

乾葛各一錢

半夏

湯浸切焙

水銀

各半兩

右上一三味同為細末將水銀與藥研勻生薑汁九如麻
子大每服一二九至五七九煎金銀花湯下無時

白朮散治小兒吐嘔脈遲細有寒

白朮

人參

半夏

麩炒

茯苓

乾薑

甘草各一錢

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去渣

溫服日二三

一方無半夏麩
有木香香附

湯小兒寒吐者由乳母當風取涼解脫致令風冷入乳變

敗兒若飲之故嘔吐也乳母當食後捏去舊宿敗乳急服
理中湯次用釀乳法其候是寒清痰夾乳吐是也凡有
此候服藥不效胃氣將絕藥不能下當服靈砂丸如大便
通宜來復丹二藥常用驗

吐乳尋田中蚯蚓屎研如泥食前米飲下五分不過三

四次妙聖惠方

熱吐
藿香散治脾胃虛有熱面赤嘔吐涎嗽及轉過度者宜服

麥門冬去心 半夏炒 甘草炙各半兩 藿香一兩用葉

石膏半兩

右為末每服五分至一錢水一盞半煎七分食前溫服

本治小兒嘔吐脈數有熱麥門冬散

麥門冬 半夏 人參 茯苓各二錢

甘草錢一

右為末每服二錢水一盞薑三片煎至五分去渣溫服

日二三服

錢氏玉露散方見吐瀉

湯治小兒伏暑嘔吐清膈飲子

香薷

淡竹葉各一兩

白茯苓

人參

半夏

檀香

甘草各半兩

白粳米合

右咬咀薄煎溫服大小加減

小兒秋夏伏暑多有熱吐其吐黃涎頭額溫五心熱小便

或赤而少乃熱吐也或乾嘔而無物宜香薷飲方見中暑

本治小兒疳積黃瘦吐食

川烏錢一

定粉錢三

艾灰錢二

龍骨錢二

右為末滴水丸如龍眼核大捏作餅子每服一餅米飲

推積吐

磨下

風寒吐

鐵粉丸治涎盛潮搐吐逆

水銀

砂下二錢

硃砂

一分

鐵粉

天南星

各一分炮

去皮時

輕粉二分

右同研水銀星散盡為度薑汁糊丸如粟米大煎生薑

湯下十五丸至二三十九丸無時

藥方

田氏朱沉煎

紫金核

方見案條

治小兒吐不定用五倍子二箇一生一熟甘草一握濕

帛裹炮過同搗為末每服米泔調下半錢七瘥

二氣散治虛實冷熱霍亂吐逆

硫黃

不夾石者細研半兩

水銀

一分與硫黃同研

右同研如墨煤色不見星為度每服一字至五分乾薑

水調下不拘時量兒大小加減此散浮泛難調先洒少

水以指緩緩研之稍稍增湯調之治大人小兒一切吐

逆諸藥不效者服此頃刻如神

禁忌

凡小兒乳哺不宜飽滿飽滿而必溢故嘔吐 生下吐

病見胎

針灸

吐乳 灸中庭一壯

吐水吐虫

胃冷

面脫白無精光口中氣冷不思食吐水當補脾益黃散

主之

冬月吐蛇多是胃虛寒而重作吐用錢氏白朮散加丁

香二粒

吐水不止者傷心痛胃冷 吐水心痛者虫痛 口中

吐沫水者後必重痛

泄瀉

虛

萬安膏治吐瀉腹痛吐乳

方見吐門

吐瀉四君子加陳皮厚朴等分同煎

一法加陳皮薑棗

滑瀉

臟腑滑泄四君子加訶子五分米飲調下

傷食瀉

黃承務子二歲病傷食而瀉眾醫與止之十餘日便青

白乳食不消身涼加噎氣昏睡咸謂困篤召錢錢先與益

黃散補肺散各三服三日身溫而不噎氣後以白餅子微

下之又與益脾散三服利止何以然利本脾虛傷食初不

與下之留連十日上實下虛脾氣弱則引肺亦虛脾肺子

母故也今先補脾則肺病自退即身溫不噎氣也然後下

其所傷或曰何不先下後補曰便青為下臟冷若先下必

大虛今先實脾而後下則不虛矣後更與補之乃安

益黃散方

見小兒

大法

寒瀉

溫中丸治胃寒瀉白腹痛腸鳴

方見吐瀉

丹瀉青亦是寒宜用蘇合香丸平胃散各等分蜜湯調服

回便青者因驚風內臟脾氣不和治宜白朮湯

醫凡大瀉引飲者其病不以新久皆宜服白朮散痢病亦

同治

熱瀉

回小兒夏月泄瀉用益黃散 瀉黃赤黑皆熱用益元散

黃栢丸之類

母瀉

醫史君子丸治疳瘦泄痢腹脇脹滿方見

診

脈小兒大便青瓣飧泄脈小手足寒難已脈小手足溫易

已

乳食不化

胃冷

醫食不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

醫乳食不消初病忽然氣出冷四肢亦冷面白無光澤精

神不定此乃胃氣不和可以大溫藥治之史君子丸益黃

散主之 若病泄瀉日久不瘥乳食不化是脾胃有風冷
先服益黃散二服後用宣風散導之胃宜再補

赤白痢

熱痢切宜下

治小兒痢疾

黃連

黃芩

大黃

甘草

右煎服赤痢加紅花桃仁白痢加滑石末

有積宜取

治痢之法若欲取積只用官局進食丸甚穩雖取積又

能治痢萬無一失積已下急以四君子湯加荳蔻訶子補

之次服厚腸香連丸得效

體弱不堪下

治小兒赤白痢多體弱不堪下大困重者麻子一合炒

令香熟為末每服一錢七蜜漿水和服效

痢瀉痢日久不瘥

與熱雜

瀉黃紅赤黑者皆熱毒

瀉青白穀不化者胃冷

白附香連丸治腸胃氣暴傷乳哺冷熱相雜渴痢赤白裏
急後重腹痛扭撮晝夜頻併乳食減少

黃連

木香各一錢

白附尖二錢

右末飯丸如粟米大每服十九至二三十九米飲下食
前日夜各四五服

蒼蘘香連丸治泄瀉不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴
切痛立效如神

黃連炒三錢

肉荳蔻

木香各一錢

右為細末粟米飯丸如米粒大每服十九至三十九
日夜各四服食前米飲下

木香丸治小兒泄瀉青白膿血相雜

黃連

吳茱萸同炒
去藥葉一兩

肉荳蔻二錢

木香一錢

右為細末麩糊丸如黍米大赤痢粟米飲下白痢厚朴

湯下空心

小香連丸治冷熱腹痛水穀利腸滑

木香
訶子肉各一黃連兩

右為細末米飲和丸如菴葶大每服十九至三十五丸

食前頻服之

赤痢四君子加赤芍藥當歸入粟米少許同煎

湯治熱痢備急方用井花水調騰茶蜜磨生薑湯則飲之

錢黃栢丸治小兒熱痢下血

黃栢去皮 赤芍藥四錢

右為末飯和丸如麻子大每服一二十丸食前米飲下

量兒加減

木治小兒赤痢搗青藍汁二升分四服聖惠方治小兒中壘下血

地治小兒尿血甘草五分以水六合煎取二合去查一歲

兒一日服令盡

冷痢

雜方

方 白痢四君子等分加乾薑減半入粟米少許同煎

方 治小兒久痢淋瀝水穀不消枳實六分搗末以米飲調

二錢七二歲兒服一錢

方 小兒噤口痢醱乳法

厚朴

枳殼各五分

白朮

芍藥各半

滑石兩

木通

陳皮

甘草各五分

右分四貼細研桃仁七枚水二盞半煎取一盞與母服

服時去宿乳令盡為妙

黃連例錢氏

加黃柏為二聖丸治

加橘皮為橘連丸

治 加榆仁為榆連丸治

加黃芩大黃為三黃丸治積熱

加阿膠茯苓為阿膠丸治

加訶子木香為小香連丸

治 加荳蔻木香為荳蔻香連丸治

加木香白附子為

針灸

白附子香連丸治痢 加阿膠當歸乾薑為駐車丸治痢

因小兒腸下滿瀉痢體重四肢不收痲痺積聚腹痛不嗜

食痰瘧寒熱 脾脘二穴在背十一椎下兩旁相去各一寸五分

明秋深冷痢不止 臍下二三寸間動脈中二壯 痢下赤

白脫肛 十二椎下節間三壯 又法翠尾骨上三寸骨陷

間三壯炷如小麥大 又法龜尾一壯脊端等骨也

腹脹附下

虛寒

腹脹虛實 凡久病吐瀉之後虛則其脈微細肺主目

胞及腮脾主四肢若色淡黃目胞腮虛腫手足冷先服塌

氣丸後服異功散和中丸四君子湯益黃散之類用諸温

藥養真氣異功散和中丸方見吐瀉四君子湯方見治虛實法

塌氣丸

胡椒兩一 蝎尾兩半

右為末糊丸如粟米大每服五七九至一二十九陳米
飲下無時一方有木
香一錢

調中丸治小兒久傷脾胃腹脹

乾薑

橘紅

白朮

茯苓

木香

砂仁

官桂

良薑各等分

右細末糊丸如麻子大每服二三十丸食後熟水下

實熱

實則脈洪實不因吐瀉久病後亦不因痢下腹脹而喘

急悶亂更有痰有熱及有宿食不化而腹脹者宜服白餅

子大黃丸解毒丸下之兼須詳認大小便如都不通先利

小便後利大便白餅子方見癖○解毒丸方
見喉痺心大黃丸方見傷寒

小兒熱結於內腹脹壯熱大便赤黃躁悶煩亂者宜瀉

奇丸

腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂喘滿可下之用紫

下虛者可

不可下

霜丸白餅子

此言未下而喘者為實故可下若誤下而喘者為虛氣附肺不可下也紫霜丸白餅子二

方見不喘者虛也不可下若誤下之則脾虛氣上附肺而

行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢母氣虛

甚即目胞腮腫四肢黃色治之用塌氣丸漸消之未愈漸

加丸數不可以丁香木香橘皮葶藶大溫散藥治之何以

然脾虛氣未出故雖腹脹而不喘可以溫散藥治之使上

下分消其氣則愈矣若氣虛已出附肺而行即脾胃內弱

每生虛氣入於四肢面目矣小兒易為虛實脾虛則不受

寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此勿誤也胃久虛熱

多生疳病或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺氣上行於四

肢而目腫若水狀腎氣漫浮於肺即大喘也此當用塌氣

丸病愈後面未紅者虛衰未復故也此下後喘故宜塌氣丸若未下而喘宜下

之○治腹脹者譬如行兵戰寇於林寇未出林以兵攻之

服未下而喘為實已下而喘為虛

必可獲寇若出林不可急攻攻則必有失當以意漸收之
即順也寇未出林謂虛氣未出而不喘不目胞腫故可
用丁香木香大溫散藥上下分清其氣而愈也寇
已出林謂虛氣已出為喘為
目胞腫須用壘氣丸漸消之

虛脹用
塌氣丸
不愈宜
下

治小兒虛腹脹先服塌氣丸不愈腹中有食積結糞小便
黃時微喘脈伏而實時飲水能食者可下之蓋脾初虛而
後有積所治宜先補脾然後下之後又補脾即愈也不可
補肺恐生虛喘

疾後服

阿魏丸治小兒食積腹如蜘蛛狀肚痛小便白濁

阿魏醋浸一宿研
如此半兩

黃連炒半兩

花碱研如粉
三錢

山查肉一兩

連翹半兩

半夏皂角水浸
一宿一兩

右為末炒神麴糊丸如荀子大每服二十九空心米飲
下喫果子多者加胡黃連米食多者加神麴山查肉食
多者加阿魏

又阿魏丸

阿魏一兩

黃連酒煮六兩

右為末醋浸阿魏一宿研如泥湯浸蒸餅丸如元氣不

足加人參

小阿魏丸

山查肉三兩

石碱三錢

半夏一兩

右為末阿魏半兩醋浸糊丸白湯下

小兒疳病或腹大

胡黃連二錢去果核

阿魏一兩半去肉神麩二錢去食積

黃連二錢去熱積麝香四粒通竅

右為末每服十二粒白木湯下

肥兒丸治小兒病多因缺乳喫食太早所致或因久患

臟腑胃虛虫動日漸羸瘦腹大不能行髮豎發熱無精神

黃連

神麩各一兩

麥芽炒半兩

木香二錢

檳榔

三箇不見火

史君子

肉苳蔻

各半兩

右為末糊為丸如桐子大每服三二十九量兒加減熟

水吞下

六神丸治如前證

丁香

木香

肉苳蔻

用麩裹煨各五錢

訶子

煨去核半兩

史君子

蘆薈

研各一兩

右為末以寒肉和丸如麻子大每服五丸至七丸温米

飲下食前

疰脹真名治法

丁奚者腹大頸小黃瘦是也無辜哺露三候大體相似輕

重立名宜服十全丹

十全丹治丁奚哺露神效方

檳榔

枳殼炒

青皮

陳皮

三稜炒 蓬朮炒 砂仁各半 丁香

木香各一 香附一

右為末神麴糊丸如黍米大空心食前米飲下百丸一方去香附砂仁丁香三稜枳殼加五靈脂白蔻史君子

蘆薈蝦蟇川芎

世治小兒腹如蜘蛛四肢瘦者用黑骨雞子破頂入蜘蛛一枚於內以濕紙糊竅用文武火煨熟去蜘蛛食其雞子累效必數枚方愈

實者分 氣消積 **中**滿分消丸

黃連 枳實 厚朴各五 乾薑

薑黃 猪苓 砂仁 澤瀉

茯苓各三 陳皮 白朮各一 半夏四

黃芩二錢 甘草一

右為細末蒸餅為丸如黍米大每服三十九溫酒送下
消痞丸快利之劑

黃連各半

枳實

黃芩

甘草

人參各三錢

厚朴七分

乾薑四分

橘皮錢一

薑黃五分

右為細末蒸餅為丸如黍米大每服三十九隨乳下

母腹脹

蘿蔔子

蘇梗

乾葛

陳皮各等分

甘草減半

如食減加白朮煎服

虛者升陽本血

升陽滋血湯二月間一小兒未滿百日病腹脹不大便

二日便瘦弱遍身黃色宜升陽氣滋血和血補血利大便

蝎稍二分

神麩三分

厚朴

當歸各錢

桃仁十箇

升麻三分

右作一服水一盞煎至半盞去查食前服

麻黃升麻湯治小兒面色痿黃腹脹食不下正月四月小兒服之神效

麻黃二分

桂枝一分

杏仁

吳茱萸

草薺菴

厚朴

麩末

羌活各一分

柴胡根各五分

白茯苓一分

白朮

青皮各五分

升麻根

蒼朮

澤瀉

猪苓

陳皮各一分

黃連五分

黃柏一分

右咬咀作一服水一大盞煎七分去查食前熱服

四寄子年五歲痘後肚急

白朮一分

陳皮

木通各五分

犀角屑

川芎

白芷

蘇梗

甘草各三分

痘後服

針灸

右咬咀水煎服

治腹脹引背食飲多漸漸羸瘦黃可灸脾脘二穴七壯

在十一頷下兩傍相去各一寸五分黃疸灸三壯

小兒腹滿不能食飲懸鍾主之

丁奚即脹治見張門丹溪條

水腫

湯系

白文舉兒五歲身面皆腫尿多

山梔炒

桑皮炒各

黃芩二錢

白朮

蘇梗各一錢半

右咬咀作三貼水一盞半煎至半盞食前溫服

退腫散氣方

赤小豆

陳皮

蘿蔔子

甘草灸各半兩

木香炮七

右為瓮末薑蔥煎服大小加減

又方

白朮炒

木香炮

甘草炙

茴香炒

青皮

各半兩巴豆三十粒去膜同青皮炒去巴豆不用

右為末米飲調下

又方用錢氏益黃散加木香去丁香加蘿蔔子去訶子為末大小加減米飲調下

水腫加喘難治

錢腫病腎熱傳於膀胱熱盛逆於脾胃脾虛而不能制腎

水反尅脾土脾隨水行脾主四肢故流走而身面皆腫也若加喘者重也何以然腎水勝而尅退脾土反勝心火心又勝肺肺為心尅故喘或問曰心刑肺肺本見虛今何喘實曰此有二一者肺大喘此五臟逆二者腎水氣上行傍侵於肺故令大喘此皆難治

針灸
明水氣浮腫 分水三壯

疳

大法

疳者小兒病癖或久吐瀉醫者妄投轉過之藥小兒易為虛實致令胃虛而三津液內發虛熱外消肌肉一臟虛則諸臟皆弱其病自胞腫腹脹利色無常漸加瘦瘠久不痊可是腸胃有風積法當宣風散導之後各依本臟補其母

諸疳皆依本臟補其母及與治疳藥冷則木香丸熱則胡黃連丸主之疳在內目腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦弱此冷證也宜史君子丸

疳在內
腹滿

史君子丸治臟腑滑及疳瘦下痢腹脇脹滿不思乳食常服安虫補胃消疳肥肌

厚朴 去麩皮薑汁
坐灸半兩

史君子 去殼一兩
麩裹煨

陳皮去白一分 甘草炙對半兩 訶子半兩半生

青黛半兩是兼驚及帶熱湯者宜此方如只藏府不調不用青黛

右為細末煉蜜和丸如小雞頭大每服一九米飲化下
兒生百日已上三歲已下服半丸乳汁化下元万無青

黛

厚腸丸治小兒失乳以食飼之不能化或生腹脹四肢瘦弱或利色無常

陳皮分三 麥蘖分五 半夏分三 枳殼分五

蒼朮分三 青皮分二 人參分三 厚朴分二

麩末分五

右為細末麩糊丸如麻子大每服二十九溫湯送下忌

飽食

本等朴丸治小兒疳瘦瀉白水腹脹

芽窮

厚朴各一兩

白朮半兩

右為細末煉蜜丸如小彈子大每服一九米飲化下三歲已下半丸

調治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調以漏蘆二兩杵為散每服以猪肝一两散子一錢七塩少許水煮熟空心頓服

吐小兒腹大泄瀉水穀不化喫食不知飢飽累效

神麩炒

麥芽炒

三稜

青皮

香附

山楂

厚朴

甘草

藿香

枳實

地黃

砂仁

黃連

連子各等分

右為末白湯調下量兒加減

丹一富家子年十四歲面黃善嘔易飢非肉不飽泄瀉一

食而多食為五

月來求治脈之兩手皆大怪不甚瘦倦以為濕熱當脾出而食少今反形健而多食且不渴予意其疾必疳虫作痢也取大便視之果蛭虫所為適往他處有一小兒醫在側教其用治虫藥治之禁其勿用去積藥約回途當為一看診而止痢也偶勿果至次年春夏之交其瀉復作腹不痛而口乾予曰此去年治虫而不治疳故也遂以去疳熱之藥濃煎白朮湯下三日而瀉止半月後偶過其家見其子甚瘦予教以白朮為君芍藥為臣川芎陳皮黃連胡黃連入少蘆薈為丸白朮湯服之半月而止禁其勿食肉與甜物三年當自愈

大蘆薈丸治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連

黃連

白蕪荑

用仁

蘆薈

木香

青皮

雷丸

破開白者佳赤者勿用

鶴虱微炒各五錢麝香另研一錢

右為細末粟米飲和丸如菴荳大米飲下一二十九不

拘時

胡黃連麝香丸治疳氣羸瘦出白虫

胡黃連

白蕪荑

仁各一兩半

黃連

木香各半兩

辰砂片研一分

麝香另研一錢

右為細末麪糊丸如菴荳大米飲下五七丸至十九三

五歲已上者十五丸至二十九服無時

榆仁丸治疳熱瘦悴有虫久服充肥

榆仁去皮

黃連

去鬚各一兩

右為細末用猪膽七箇破開取汁與二藥同和入碗內

甑上蒸九分每日一次候日數足研麝香五分蒸餅湯

浸一宿同和成劑丸如菴荳大每服五七丸至一二十

丸米飲下無時

右四方治瀉而多食為虫疰也

錢木香丸治時時下利唇口青白 如聖丸治冷熱疰瀉

瀉而少食為虫疰

二方並見本條

没石子丸治洩瀉白濁及疰利滑腸門痛

木香 黃連各一分 没石子一枚 葶藶仁二箇

訶子肉三箇

右為細末飯和丸如麻子大米飲下十五丸量兒加減

食前

湯休息痢及疰瀉痢遷延日月百藥俱試飲食不妨便痢

不止用雞子一枚打破鎔黃蠟一塊如指大以雞子和炒

空心喫盡百醫百效無不獲安

米小兒疰痢垂死者取益母草炙食之取足瘥止甚佳

右治瀉而少食為冷疴也

獨脹不瀉治法見脹門

疴在外鼻爛

疴疴在外鼻下鼻爛自揉鼻頭上有瘡不着痂漸透耳生

瘡

走馬牙疴神效乾薑白礬末子燒焦存性為末傅患處

鼻疴治法先用甘草白礬湯洗淨後糝蘆薈黃連黃柏

末日三傅一方用米泔洗黃連末傅日三四次亦佳

紅鉛散治走馬疴綠礬不以多少色鮮明者入乾錫用

炭火燒鍋赤傾出以好酒洒拌勻再入鍋如此數遍色紅

研作細末入麝香少許先以溫漿水洗嗽淨用指蘸藥有

疴處貼之

乳香丸治走馬牙疴如神

乳香

輕粉

砒研各五分

麝香少許

右先將乳香研細入輕粉麝香共再研勻用薄紙一張葉潤去藥內按過揉紙少許丸如黃米大臨臥將藥填在患處至明則愈忌食醬醋鹽等物

蘭香散治鼻瘡爛

蘭香葉燒灰 銅青五 輕粉二

右末令勻看瘡大小乾貼之

龍骨散治口疳走馬疳

砒霜一 粉霜半 龍骨一 定粉半

龍腦半 蟾酥半

右先研砒粉極細次入龍骨等研次入定粉等同研每

用少許傳之

經治小兒走馬疳蝕透損骨及小小攻蝕必效方天南星

一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麪裹燒候雄黃作

汁以蓋子合定出火毒去麩研為末入麝香少許拂瘡驗
白粉散治諸瘡

烏賊魚骨末七 白芨末七 輕粉七

右末先用清漿水洗拭過貼之

山 小兒牙疳用茴香桔梗燒灰存性傅之如乾油調傅

湯 五福化毒丹治腫鼻清膈涼血

玄參 桔梗去蘆各一兩 赤茯苓 人參

牙硝 青黛 甘草各一分 麝香五分

一方有龍腦五分

右除麝香牙硝另研一處為末次和青黛等煉蜜丸如
芡實大金銀箔為衣薄苛湯化下瘡疹餘毒磨生犀角
水下上焦熱壅口齒鮮血宣露臭氣用生地黃汁化下
食後

大抵疳病當辨冷熱肥瘦其初病者為肥熱疳久病者為瘦冷疳是也冷者木香丸熱者黃連丸主之冷熱之疳尤宜服如聖丸

胡黃連丸

胡黃連

黃連

各半

硃砂

一分

右上二物為細末研入硃砂末都填入猪膽內用淡漿於砂銚子內懸胎煮一飯時久取出研入蘆薈麝香各一分飯丸如麻子大每服五七丸至一二十九丸米飲下食後一方加蝦蟇半兩不燒

木香丸

木香

青黛

另研

檳榔

肉蔻

去皮各一分

麝香

另研一分

續隨子

一兩

蝦蟆

三箇先用繩繫

兩乾絲存性

右末蜜丸如菉荳大每服三五丸至一二十九丸薄荷湯

下食前

如聖丸治冷熱疳瀉

胡黃連

川黃連

白蕪荑

去皮炒各三兩一本作一兩

史君子

去殼一兩麝香五分

乾蝦蟆

五箇酒浸煮成膏

右前藥為末與膏丸如麻子大每服人參湯下二三歲

五七丸已上十九至十五丸無時

關小兒冷疳多渴好以冷地煩躁啼叫飲食不進漸成羸

瘦其候難明有若熱證但大便滑泄百藥不效是也因女

子百藥俱試而無偶中者竟與錢氏木香丸不數服而愈

自後凡有此證無不獲驗

攝錢氏肝疳白膜遮睛

湯氏肝疳眼白青兩眼睛痒

萌錢氏筋疳瀉血而瘦並當補肝地黃丸主之

方見勞瘵節六味地黃丸

驚疳 麝香丸治小兒一切驚疳等病

草龍膽

胡黃連各半

木香

蟬蛻去頭足洗淨各

一

瓜蒂

龍腦

麝香

牛黃各一錢並各自研

右猪膽為丸如桐子及芫荳大驚疳或秘或瀉清米飲送下小兒五七粒至一二十粒眼疳猪肝湯下疳渴燂猪湯下猪肉湯下亦得驚風發搐眼上窠薄苛湯下一九更水研一丸滴鼻中牙疳瘡口瘡研貼虫痛苦練根湯或白蕪荑湯送下百日内小兒大小便不通水研封臍中有虫候乾漆麝香各少許并入生油一兩點溫水化下一大丸慢驚勿服

因 睡驚丸治小兒一切驚疳食積風癩之證

史君子五十塊 香墨一大塊 金銀箔各七片 膩粉二錢

右先將史君子存性同墨研細次入金銀箔乳鉢內研
 次入膩粉并麝香少許研令極細稀糊丸如桐子大陰
 乾每服一九薄苛湯磨下一歲已下半丸一名青金丹
 極效

田氏涼驚丸治小兒驚熱疳瘦乳癖方見驚積

錢氏心疳面黃頰赤身壯熱當補心安神丸主之方見治虛實法

湯氏心疳口内生瘡

田氏安神丸治心虛疳熱面黃頰赤壯熱驚啼神志恍惚

不寧方見治虛實法

鰲甲散治疳勞骨蒸

鰲甲九肋者湯浸用童便塗炙

黃芪蜜炙

白芍藥各一兩

生熟地

地骨皮

當歸

人參去蘆各半兩

右咬咀每服二錢水半盞煎服

猪肚丸治骨蒸疰勞肌體黃瘦

木香兩

黃連

生地

青皮

銀柴胡去

鱉甲

九肋者湯浸用童便塗炙各一兩

右為末猪肚一枚入藥於內以線纏之於沙礮內懸胎煮熟取出細研猪肚為丸如麻子大米飲送下大小加減不拘時服

龍膽丸治疰病發熱

龍膽

黃連

史君子肉

青皮

各等分

右為末猪膽汁和丸如桐子大每服三十粒量兒加減臨臥熱水下

右四方治疰熱安神丸其寒補心鱉甲散其溫補脾後二方苦寒瀉脾瀉濕熱也

烏犀丸治小兒疰熱腹内生虫肚大手足疲弱丁奚疳

羸此方治海
熱如神

黑牽牛二兩

史君子

半七錢

青皮二兩

雷丸

二錢半

苦練皮

半兩一方不用練皮用蓋二錢半

鶴虱

五錢

右同入鍋內炒焦為末麪糊丸如黍米大三歲見二十

丸米飲下食前烏犀丸食後黃龍丸

二丁丸治乳癰食癰疔熱如神

方見癰條

疔熱當服進食丸磨積仍間服化虫丸後服鱉甲散退

熱次服肥兒丸

進食丸方見癰鱉甲散方見前

治疔熱化虫丸

白蕪荑

黃連

神麩

麥芽

各炒等分

右末糊丸如黍米大空心米飲下猪膽汁尤佳

肥兒丸

方見前

右疔熱當以積熱門參用如熱有作止者與潮熱門參

用可也

脾疳

脾疳面黃腹大食泥土當補脾益黃散主之方見治法

脾疳食不消胃疳多吐

大胡黃連丸治一切驚疳腹脹重動好喫泥土生米不

思飲食多睡吼嗵臍疳或瀉或秘肌膚黃瘦毛焦髮黃飲

水五心煩熱能殺虫進飲食兼治瘡癬常服不瀉痢唯泥

飲唯

胡黃連

黃連

苦練子各一兩

白燕去扁

秋初

乾蟾頭旋存性另

麝香另研

三錢

青黛另研

蘆薈另研

右先將前四味為細末猪膽汁和為劑每一丸如胡桃

大入巴菝仁一枚置其中用油單紙一重裹之同米一

升許蒸米熟為度入後四味為丸少入麪糊丸如麻子

大與十九或十五九清米飲下食後臨臥日三服

大蕪蕪湯又名梔子茯苓湯治黃疸土色為熱當小便

不利今反利者知黃色髮黃脫落知膀胱腎俱受土邪乃甚熱之症鼻下

斷作瘡者土逆行營氣伏火也能乳者胃中有熱故也喜食土者胃氣不足面色

黑者為寒大便青為濕褐色血黑色熱高問黃色有熱治法

當滋營潤燥內除寒熱外致津液

山梔三分 黃栢二分 甘草各二分 大蕪蕪五分

黃連 麻黃 羌活 柴胡各三分

防風一分 白朮五分 茯苓三分 當歸四分

右件剉如麻苴大作一服水一盞半煎至一盞去渣稍

熱服食前

右三方治疳黃食土前一方寒多者宜服後二方熱多

者宜之

疳積黃食積

白朮

黃連

苦參

山查各等分

右用糊丸如麻子大食後白朮湯下十五丸

小兒疳黃雞彈劍一小竅入巴荳淨一粒紙糊孔煨熟

去巴荳食之隔一日再喫一二箇

小兒喫泥石膏黃芩陳皮茯苓甘草白朮散煎服

治小兒喫泥及腹肚臑粉一分用沙糖搜丸如麻子大

空心米飲下一丸瀉出土瘡瘡如掌切膿也

初病疳津液少者當生胃之津液白朮散主之唯多則

妙

龍粉丸治疳渴

草龍膽

定粉殺

烏梅肉焙

黃連各二分

右為細末煉蜜丸如麻子大米飲下一二十九無時

湯 三稜散治小兒尿白濁久則成疳宜踈脾土消食化滯

三稜 蓬木炒 益智仁 甘草各一兩

神麴炒 麥芽炒 橘紅 各半兩

右為末白湯調下

世 黃龍丸治停食化積磨積

三稜 蓬木各三兩 青皮 陳皮各一兩半

山查 乾薑各七錢半 檳榔 半兩

右晒乾為末糊丸黍米大三歲兒每二十九食後薑湯

下食前烏犀丸相間服此治小兒疳積等證無不效者

烏犀丸方見疳熱條

世 膽礬丸治疳消癥進食止瀉和胃追虫

綠礬 真者為龍末一錢 膽礬 真者為龍末一錢 大棗 四十箇去核

好醋 升

已上四物同熬令東爛候和後藥

史君子

去殼
二兩枳實

黃連

訶子

去核各
為末

各一兩

巴荳

二十七箇
去皮破之

已上五味同炒黑約三分乾入後藥

夜明砂

蝦蟆

燒存性
各一兩
苦練根皮

已上三味再入炒候乾同前四物杵羅為末同前膏和

入臼中杵干下如未成旋入熟寒肉亦不可多恐服之

難化太乾即入溫水亦可九如棗荳大每服二三十九

米飲溫水下不拘時

肥兒丸治小兒疳積

蘆薈

另研

胡黃連

各二錢

神麩

四錢

白朮

山查

炒各半兩

蕪荑

炒二錢半

右為末將蘆薈末拌勻猪膽汁九如粟米大每服六十

丸食前白湯下

本 蘆薈丸治小兒疳積秘方

蘆薈

荊芥

黑丑

青皮

各等分

右治炮為末麪糊丸如粟米大一歲兒已下一丸或二丸亦不妨量大小加減

肺疳

總 肺疳氣喘口鼻生瘡當補脾肺益黃散主之方見治虛實法

腎疳

腎疳極瘦身有瘡疥當補腎地黃丸主之方見勞瘵即六味地黃丸

湯 腎疳齒爪黑

右腎疳羸瘦瘡疥治法當與虛羸門相參用之

骨疳

總 骨疳喜臥冷地

湯 木香丸治渴好臥冷地

疳方

世 五疳保童丸治小兒乳食不擇冷熱好食肥膩恣食甘鹹臟腑不和生疳

青黛 苦練根皮 夜明砂 五倍子

蘆薈 黃連 龍膽草 白蕉蕒

乾蟾各一分 麝香少 蟬腿去嘴瓜一分 猪膽大者五箇特諸

蒸焙

右件粟米煮糊為丸如麻子大一歲兒三九不拘時米飲下日三服忌猪肉

腦者

治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦益腦用鯽魚膽滴於鼻中連滴三五日效

小兒腦疳者是胎熱所為但頭皮光急頭髮作穗或有頭瘡腫至顙顙腫則多損眼此疾因兒在胎中母臨月房事不已而成項軟倒肥而不瘦天柱骨倒也

附子生去皮 南星

右末生薑自然汁調攤貼患處次服防風丸并瀉青丸

疳積

小兒久患疳疾體虛久不進飲食患久諸候退只是天

柱骨無力醫者不識謂之五軟用白殭蚕真者去絲炒為末每服五分或一錢薄苛酒調下日三更須貼藥

貼藥生筋散

木鱉子三 草麻子三十

右各取肉同研用一錢津調先烘上令熟貼之

右疳五軟蓋痿屬也不若用地黃丸及黃栢龜板之類

為愈

疳積

小兒無辜疳者其候面黃髮直時時壯熱飲食不生肌

膚積經日月遂致死者謂之無辜疳也言天有鳥名曰無

辜晝伏夜游洗浣衣禡露之經宿或遇此鳥飛從上過將

衣禡與小兒穿臥便令兒有此疾如禽獸生下有嚙虫若

不速去當損其命又腦後有核初生軟而不覺痛其中有

虫如米粉得熱氣漸長大則筋結定虫隨氣血流散所以
 停留子母相生侵蝕臟腑肌肉作瘡或大便泄膿血致使
 小兒漸漸黃瘦頭大髮墜手足細弱生十二件無辜疾症
 天吊 胡孫瘰 鷺口 木舌 懸壺 重齶 着瘰
 臍風 撮口 重舌 乳淵 龜胸
 驚甲散

驚甲 醋炙 三分 檳榔 三 沉香 乙 漏蘆

甘草 炙 牛蒡子 炒 史君子 赤芍藥

訶子 炮去核 各半兩

右為瓮末每服一錢水半盞煎六分去渣溫服

針灸 明多疳者 頰會 壯 瘡蝕斷斷具穢衝人 勞官 壯

診 疳疔脾胃病亡津液之所作也因大病或吐瀉後醫又

以藥吐下致脾胃虛弱亡失津液且小兒病疳皆愚醫之

所壞病假如潮熱是一臟虛一臟實而內發虛熱也法當
補母而瀉本臟則愈假令日中發潮熱是心虛熱也肝爲
心母法宜先補肝母肝實而後瀉心得母氣則內平而
潮熱自愈醫見潮熱妄謂其實乃以大黃牙硝葷諸冷藥
利之利既多而不能禁則津液內亡漸成疴也又如癰病
發作寒熱飲水脇下有形硬痛法當用藥漸消磨之醫反
以巴豆礪砂葷駛藥下之小兒易虛易實下之既過胃中
津液耗損漸成疴瘦又有病傷寒五六日間有下證以冷
藥下之太過致脾胃虛而津液少即便引飲不止而生熱
也熱氣內耗肌肉外消他邪相干証變諸端亦成疴病又
有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津液煩燥亦能成疴
也

小兒病癰由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不止或

喘而嗽與潮熱相類若不早治必成勞疰以其有癰癥則
令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多卽蕩滌脾胃
亡失津液不能傳化水穀其脈沉細益不能飲食致脾胃
虛衰四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成疰矣

肥疰卽脾疰也身瘦虛黃乾而有瘡疥其候不一種種異
端今畧舉言之目濇或生白膜唇赤身乾黃或黑喜臥冷
地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水痢色變易腹滿身
耳鼻皆有瘡髮鬢作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也

不治疰

心疰者苦要驚啼常只喫水少食辛味耳邊有青脈舌
上有焦點者不治○肝疰者目帶青左脇下硬多吐沫眼
頭黑者不治 脾疰者肚大青筋脣口無血色人中平下
痢不止者不治 肺疰者咳逆氣急瀉白水身上黑斑者
不治 腎疰者要與醎醋喫水不住小便如粉汁齒黑有

瘡骨出耳乾腦焦不治

虛羸

寒熱

虛羸脾胃不和不能食乳致肌瘦亦因大病或吐瀉後

脾胃尚弱不能傳化穀氣有冷者時時下痢唇口青白有

熱者身壯熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香丸主之

夏月不可服如有證則少服之熱者胡黃連丸冬月不可

服如有證則少服之虛羸與瘧同治也○木香丸胡黃連丸方並見海條

小兒瘳積其狀漸黃瘦拍背如鼓鳴脊骨如鋸乃積而

生熱成疳也宜服蘆薈丸露星膏

蘆薈丸

龍膽草

黃連

蕪荑

去皮先炒青色次入煎二味一處炒赤色

各一兩

右為末另入蘆薈一分和勻爛飯丸如黍米大二歲兒

服三十九空心米飲送下

露星膏

黃芪蜜水

胡黃連

地骨皮

柴胡各等分

右為末煉蜜丸如茨實大隔宿酒浸露一宿次日澄去酒薄許湯浸服之

橘連丸治疳瘦久服消食和氣長肌肉

橘皮一兩

黃連米泔浸一宿一兩半

右為細末另研入麝香五分用猪膽七箇分藥入膽內漿水煮候臨熟以針微刺破以熟為度煮粟米粥和丸如菽豆大每服十九至三十九米飲下量兒加減無

時海菴云黃連若燥可時以瀉野火長肌肉

二聖丸治小兒臟腑或好或瀉久不愈羸瘦宜常服

黃連主

黃栢去粗皮各一兩

右為細末入猪膽內重湯煮熟丸如菘菹大每服二三十丸米飲下量兒加減頻服無妨

九

潔小兒疳病肌羸血氣不足同大人勞瘵之疾治之

右以潔古此言論之不拘冷熱虛羸皆用四君子地黃丸與前藥相兼服為得也

雜方

聖又方治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用鯊頭一枚燒灰杵末新汲水下五分匕立可

針灸

聖羸瘦不生肌膚 胃脘灸一壯

回小兒疳瘦於胸下骨尖上灸三壯次於脊下端尾翠骨尖上灸三壯

小兒疳瘦脫肛體瘦渴飲形容瘦悴諸方不瘥者取尾翠骨上三寸骨陷中灸三壯

小兒身羸瘦資豚腹腫四肢懈惰肩背不舉章門二穴各

灸七壯

母氣不足則羸瘦肉極

鶴節即虛羸之異名也

虛

小兒鶴節由稟賦不足血氣不榮肌肉瘦瘠則骨節皆露如鶴之足皆腎虛不生骨髓之故治法宜錢氏地黃丸加鹿茸牛膝

宿食

脾

消食丸治宿食不消又名消乳丸

砂仁

陳皮炒

三稜炒

神麩炒

麥芽

炒各半兩

香附炒

右末麩糊丸如麻子大食後白湯送下大小加減

七聖丸

三稜

蓬朮

川練

青皮

陳皮

芫花

杏仁

右件等分先用醋浸芫花一宿炒漸乾次入蓬蘽同炒
 赤色又入陳練等再同炒一處令微焦取出為末前藥
 如各半兩杏仁亦用半兩湯浸去皮尖雙仁不用細研
 入巴荳二十粒去油和勻醋糊丸如黍米大一歲兒常
 服二九臨臥溫熱湯送下使日間所食之物一夜而化
 永無疳疾能使黃瘦子頓作化生兒今之小兒可去巴
 荳只入杏仁名七聖丸是也

痞

虛

枳木丸

方見內傷飲食

○飲食不進四君子加薑棗煎○枳實

理中丸

方見傷寒

實

痞者塞也其病腹內氣結脹滿壯熱是也當疎利大便
 破結散氣常服進食丸

鹽甘遂散治小兒痞結雖服湯藥斬利而滯實不去心下
堅脹按之輒啼內有伏熱破結

甘遂

炒

青皮

黃芩

大黃

炒各

右咬咀煎去渣服量大小加減以利則止用之無不效
湯戶部張侍郎小娘子患此蘊積結聚已經年矣其候腹
滿壯熱大小便閉不食諸醫皆作虛熱潮熱或作胃寒不
食治然既不食大小便自然少又欲作疳熱治百藥俱試
而無一中勢已窘迫招予視之問曰合服何藥答曰當服
甘遂大黃張驚駭曰前諸醫者皆用補劑此女不進食久
矣不宜利動腸胃予答曰信我者生逆我者死張曰更有
無甘遂而次於此藥方者可否予令即服大承氣湯二服
而愈次日診之尚有餘滯積實其症必過數日而腹閉須
服前藥始可除根數日後果再閉腹滿痞結再投此藥一

服而痊

小兒急欲乳不能食由客風熱入兒臍流入心脾經即舌厚唇燥口不能吮乳當涼心脾

哺露

虛

哺露者因乳哺不消脾胃衰弱漸不能食血氣減損肌

肉不榮柴骨羸露吸吸苦熱謂之哺露也宜麝香進食丸

方見本條

癖

診

小兒積症而黃腫

肚脹

面合臥地

小便

如油

多嘔

眼睛黃

腹內虛鳴

多睡

眼白黃

赤白痢下

髮黃

眼赤

多瀉

黃

凡有積滯須辨虛實况孩兒虛瘦長短黑白南北古今不同不可一槩論也予今之法實者可服進食丸虛而微白

及疳瘦者宜服肥兒丸

肥兒丸方見疳門心疳條為丸如黍米大兒一歲十九飯飲下

小兒腹中有癖不食但飲乳是也當漸用白餅子送下

白餅子

滑石

輕粉

半夏

湯洗焙乾

南星

各一錢為末

巴菝

二十四箇去皮膜水一升煮水盡為度

右研勻巴菝後入衆藥以糯米飯為丸如小菜豈大捏

作餅子兒三歲已上三五餅四歲已下一二餅蔥白湯

下臨臥服

進食丸治乳食不化心胸脹滿疳積肚疼

木香

枳殼

當歸

代赭石

硃砂

另研三錢

巴菝

去油膜一錢

麝香

另研五分

右為細末麪糊為丸如黍米大一歲二丸量兒大小加

減米飲送下

活雙聖丸治小兒身熱頭痛飲食不消心腹脹疼痛大小
便不利或下重數起未瘥可再服

巴菝六十箇去皮
心膜研去油 甘遂 麥門冬去心
三兩

錢五 甘草炙一兩 硃砂另研
一錢 牡蠣二兩

生核取仁四兩
柴核半另研

右麥門冬甘菝甘遂牡蠣四味為細末入巴豆硃砂麩
仁合和搗二千杵更入少蜜搗和極熟旋丸兒半歲服
如蘇子大兒一歲服如麻子大分為二丸兒二歲服如
麻子大一丸兒三四歲服如麻子大二丸五六歲服如
麻子大三丸兒七八歲服小菝大二丸兒十歲微大如
小菝大三丸以雞鳴時分服之如至日出不下者熱粥
飲數合投之即下丸藥皆雙出也若利甚濃前冷粥數
合與之即止

集

珠丸治小兒一切積聚驚涎宿食乳癖大小便澀滯

療腹脹行滯氣

巴豆仁十四箇水浸一宿細研

木香

白丁香

丁香各五分

滑石二錢

輕粉五分留少許為衣

右為末研勻濕紙裹燒粟米飯為丸如麻子大一歲兒

一九八九歲至十五歲服八九枣子煎湯放冷下如挾

風熱難動者先服涼藥一貼乳癖者臨臥服數丸

本消積丸治小兒食積氣濕氣面黃白多腫大便黃赤酸

臭

砂仁十二箇

丁香九粒

烏梅肉三箇

巴豆去油三粒

右細末糊丸如粟米大三歲已上五六丸已下二三丸

用溫水下無時服大凡小兒身溫壯熱非變蒸之候大

便白而酸臭為胃有畜冷宜此藥消下後服溫胃藥若

身温壯熱大便赤而酸臭為胃有畜熱宜此藥下後服

涼胃藥無不愈方有史
君子七散

乳癖
四丁香化癖散治乳癖

白丁香 蜜陀僧 硫黃已上各二錢 礶砂五分

輕粉少許

右研細末每一歲兒服五分男病女乳調女病男乳調
出下黑糞為度後用通膈丸泄之

四二丁丸治小兒乳癖

白丁香兩半 丁香 蜜陀僧各一兩 韶粉一錢

硫黃三錢

右細末糊丸如小荳大三歲兒十九日哺時米飲下飲
乳者乳汁下次日當取下惡物熱即隨退加黃芩屎一

錢尤妙

紫霜丸

代赭石細研水飛二錢

巴豆二十一粒去油心皮膜

杏仁二十一箇去皮尖

右為細末飯丸如粟米大每服三五丸至十九丸皂莢子

湯下無時海藏云五色加減並見治法

湯驚癇須用礞石藥方可治之

右七方治癇皆峻劑若稍涉虛者必用四君子及益黃散之類兼服之

無癇

治小兒氣癇取三稜針作羹粥以米麪為之與乳母

食每日取一匙大與兒喫亦得作粥與羹熟食之治小兒

十歲已下及新生百日無問癩熱無辜瘡癇等皆理之妙

不可言者

針灸

小兒癇氣久不瘥者灸中脘一穴章門二穴各七壯章

門在大橫外直臍季脇肋端側臥曲上足伸下足舉臂取
之 中腕在上腕下一寸臍上四寸居心蔽骨與臍之中
從髕胛下取病人四指定位併灸臍後脊骨中二十七壯無
不驗

脾弱多困

虛

脾胃不和四君子加白朮一倍薑棗煎 脾困四君子
加木香砂仁人參各半錢煎 脾胃虛弱生氣多困四君
子加炒半夏麩沒石子等分為末入冬瓜子少許同煎

治脾風多困用人參散入慢驚參用

人參

冬瓜仁

各半兩

南星

切片用漿水盪
汁黃存性一兩

右為細末每一錢水半盞煎二三分溫服

渴

渴有三種 一者乘熱積於心脾煩燥大渴引飲宜白

湯謂不因吐瀉大病忽然而作

虛熱

二者因久病或取轉過度致脾虛引飲宜白朮散方見消瘴

海藏云治發渴四君子加乾葛枇杷葉先以葱湯煮過次入乾葛各等

分入木瓜少許同煎服亦治虛渴法也

濕熱

三者因患濕熱病熱結膀胱小便不利大渴引飲有表裏症者宜五苓散主之

大小便不通

雜方

無小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水

先嗽口了吸啞兒前後心并臍下手足心共七處每一處

凡三五次嗽口吸啞取赤紅為度須臾自通不爾無生意

有此證者遇此方可得再生矣

回生下不大便治法先以硬蔥針縱入肛門如大便不下

後用牛黃散送硃砂丸一時自見

握宣丸治小兒便難燥結或服瀉藥腹脹周亂命在須臾
可用此丸不移時大小便自利

巴荳一錢半 硫黃 良薑 附子

檳榔 甘遂各等分

右為細末粟米飯和丸如菽豆大用椒湯洗小兒男左
女右手握之用綿裹定看行數多少置藥洗去不用即
止

錢郁李仁凡治檳榔小兒大小便不通并驚熱痰實欲得
澹動者

大黃一兩酒浸半日炒乾為細末 郁李仁去皮研

滑石細研

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石丸如黍米大二歲
兒服三二丸量大小與之或乳汁或薄荷湯下食前

黃疸

陽黃則大小便赤澀身熱是脾土與心火相搏為陽病
法當先利小便後下大便

凡治黃病腹脹當用茵陳蒿湯調下五苓散若欲利小便
去大黃欲利大便則加大黃之類有陽證可服謂面赤飲
水者是也茵陳湯五苓散
方俱見傷寒

身疼體背強大小便澀皮膚面目齒爪皆黃小便如屋
塵色利者易治澀者難治宜服五苓散加茵陳煎湯調又
宜服導赤散加茵陳煎或身熱宜服小柴胡湯甚者服承
氣湯

田小兒身體蒸熱胸膈煩滿皮膚如青橘之黃白睛亦然
濕熱所致也宜加減瀉黃散主之此藥能退脾土復腎水
降心火

黃連

茵陳各五分

黃柏

黃芩各四分

梔子

茯苓

澤瀉各三分

右咬咀都作一服水一大盞煎至六分去查稍熱服食

前

陰黃

陰黃則清便自調面目及身黃四肢冷是脾虛不能制

腎水當用益黃散下史君子丸益黃散方見治法史君子丸方見雜

淡黃白者胃不和也平胃散調中丸渴者人參白朮散平

散方見泄瀉調中丸方見腹痛人參白朮散方見消渴○月裏生黃見胎驚條

針灸

飲水不渴面黃 陽剛穴針

診

黃相似 身皮目皆黃者黃病也身痛背強大小便

澀一身盡黃面目指爪皆黃小便如屋塵色着物皆黃渴

者難治此黃疸也此一證多發於大病後又有一證不因

病後身微黃者胃熱也大人亦同又有面黃腹大食土渴

者脚疔也又有自生而身黃者胎疔也又書云諸疸皆然
色深黃者是也若淡黃兼白者胃怯不和也

蘇子栝皮湯 治傷寒身黃發熱

梔子八 黃栝一 甘草炙半

右水煎去渣溫服

犀角散 治小兒黃疸一身盡黃

犀角一 茵陳 乾葛 升麻

龍膽草 生地各半 寒水石七錢

右咬咀白水煎服一方治小兒忽發黃面目皮肉盡乾

黃以乾葛汁和蜜調服神珍方無乾葛用瓜萎

連翹赤小豆湯 治小兒傷寒發熱身黃

麻黃 連翹 甘草 生薑

赤小豆 生梓白皮各二 杏仁四十

大棗十二箇

右咬咀水煎服一方生小麥苗搗汁服之立效

消食丸 治小兒脾胃不和常服寬中快氣消乳食正顏

色 砂仁 陳皮 三稜 蓬朮

神麩炒 麥芽炒 香附米泔浸炒 枳殼

檳榔 烏梅各半兩 丁香二錢半

右為末麩糊丸如菉苳大食後紫蘇湯下二三十丸

茯苓滲濕湯 治小兒黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲水身體

面目俱黃小便不利不得安臥不思食飲

茯苓五分 澤瀉三分 茵陳六分 猪苓

黃芩 黃連 山梔 防已

白朮 蒼朮 陳皮 青皮

枳殼各二錢

右吹咀水煎徐溫服

丹治小兒吐瀉黃疸

三稜

蓬朮

青皮

陳皮

神麴

麥芽

黃連

甘草

白朮

茯苓

各等分

右為末溫水調服若傷乳食吐瀉加山查時氣吐瀉加

滑石發熱加薄荷

瓜蒂散 治小兒忽發心滿堅硬脚手心熱變為黃疸不

急治則殺人

瓜蒂七

赤小豆七

秫米七

右為末用一字吹兩鼻內令黃水出餘末盡水調服之
得吐出黃水即愈一方瓜蒂一兩赤小豆四兩為末每
服一錢溫水調服藥下即臥當吐清黃汁為效虛者不

攝身法

宜服

腹痛

曲腰乾節者為內節

切

小兒腹痛曲腰乾哭無淚面青白唇黑肢冷為盤腸內

疝凡有此證急煎蔥湯淋洗其腹揉之蔥慰臍腹間良久尿自痛中出其疼立止續次服藥

乳香

沒藥

各少許透明者細研

右件木香一塊於乳鉢內磨水一分滾數沸調乳沒末

此藥只一服效

錢釣藤膏治小兒腹中極痛乾啼後偃名盤腸內疝

乳香

研

沒藥

研

木香

薑黃

各四錢

木鱉子仁

二十箇

右先將後三味同為細末次研入上二味煉蜜和成劑

收貯每一歲兒可服半皂子大餘以意加減煎釣藤湯

化下無時次用魏香散

魏香散

蓮木半兩

阿魏一錢

右先用溫水化阿魏浸蓮木一晝夜焙乾為細末每服一字或半錢煎紫蘇米飲空心調下

無蒜乳丸治冷證腹痛夜啼

大蒜

一種慢火煨香熟研爛

乳香

另研五分

右研為丸如芥菜子大每服七粒乳汁送下

右四方治寒腹痛屬盤腸內弔其候曲腰乾哭是也

因胃虛冷面皸白色腹痛不思食當補脾益黃散主之若

不利者調中丸主之

益黃散治下利而痛也調中丸治下利而痛也

調中丸

白朮

人參

甘草

炒各半兩

乾薑

炮四錢

右為細末蜜丸如菉豆大每服五七丸至十五丸食前

不思飲食者為胃冷

溫水下海藏云仲景理中例也

當歸散凡小兒夜啼者臟寒而腹痛面青手冷不吐乳是

也宜此方服之效

當歸去蘆 白芍藥 人參各一錢 甘草炙五分

桔梗 陳皮各一錢

右咬咀煎五分時時少服愈

右三方治寒腹痛為胃虛其候不思食是也

面赤身熱便黃 熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便赤黃與三黃丸人

參湯下三黃丸方見治發熱法

四腹痛夜啼服牛黃如豆大乳化喫之於臍下書田字立

安聖惠方

面黃白大便酸臭為積 積痛口中氣溫面黃白目無精光或白睛多及多睡畏

食或大便酸臭者當磨積宜消積丸甚者白餅子下之後

和胃用白朮散消積丸白餅子方見

食積腹痛硬必用紫蘇蘿蔔子之類

小兒好喫粽成肚痛用黃連白酒藥等分為丸服

三稜散治積氣肚痛

砂仁 甘草 益智炒去殼 三稜

蓬朮 青皮炒各等分 為末白湯點下

虫痛面觥白心腹痛口中沫及清水出發痛有時安虫散

主之小兒本怯者多此病田氏云虫痛啼哭俛仰坐臥不安自按心腹時時大悶而無正

色或青或黃唇白又目無指色口吐涎沫此為虫痛

安虫散治小兒虫痛

胡粉炒 鶴虱炒 川練子去皮核 白礬枯二錢半

右為細末每服一字大者五分米飲調下痛時服

治虫動痛極不可忍用乾漆半兩檳榔一枚生用窰老

一塊再煨細研三件一處為末空心熱酒調良久取下

立愈驗霍老為室中 ○又方用乾漆一兩搗碎炒令烟盡

出 用新汲水入生麻油空心調下

安虫丸治上中二焦虛或胃寒虫動及痛

乾漆炒烟盡 雄黃分 巴豆霜一錢

右為細末糊丸如黍米大量兒大小服之取東引石榴

根煎湯下或苦練根或蕪荑湯下五七丸至三十九

發時服

蕪荑散主治同前凡小兒痛時便高聲啼叫人中上鼻頭

唇口一時黑色脈法當沉弱而弦今反脈大是虫症也

白蕪荑 乾漆炒各

右為細末每服一字或五分或一錢米飲調下發時服

用蛔虫用練樹根為君佐以二陳湯煎下

診

積痛食痛虛痛大同小異惟虫痛者當口淡而沫自出治之隨其症用藥虫與積相似小兒本怯故胃虛冷則虫動而心痛與癩畧相似但目不斜手不搐也安虫散主之辛氏女子五歲病虫痛諸醫以巴豆乾漆硃砂之屬治之不效至五日外多哭而俛仰睡臥不安自按心腹時大叫面無正色或青或黃或白或黑目無光而慢唇白吐沫至六日胸高而臥轉不安召錢至錢詳視之用蕪荑散三服見目不除青色大驚曰此病大困若更加瀉則為逆矣至次日辛見錢曰夜來三更果瀉錢於瀉盆中看如藥汁以杖攪之見有元藥錢曰此子肌厚當氣實今證反虛不可治也辛曰何以然錢曰脾虛胃冷則虫動而今反目青此肝乘脾又更加瀉知其氣極虛也而元藥隨糞下即脾胃已脫兼形病不相應故知死病後五日昏篤七日而死

鴛口

胎毒

巢氏病源鴛口候者小兒初生口裏白屑滿舌上如鴛口故曰鴛口此乃胎熱而心脾最盛薰發於口也治用髮纏指頭蘸井花水揩拭之睡時黃丹煨出火氣搽於舌上方如用前法其舌上白屑不脫可煮粟荻汁令濃以綿纏指頭拭之若春夏無粟荻可煮栗木皮如用井花水法小兒初出腹有連舌下有膜如石榴子者中隔連其舌下後令兒言語不發舌不轉也可以爪甲摘斷之微有血出無害若血出不止燒髮灰傅之即止

口瘡

風寒

大人小兒口瘡不開牙關緊者諸藥勿效天南星末一錢腦子少許相和研勻用指蘸生薑自然汁蘸藥於左右大牙根上擦之立開

調初生口噤不開不收乳用赤脚蜈蚣去足炙末猪乳汁調下五分三四服愈

聖小兒生下七日口噤牛黃些少竹瀝調下一字以猪乳滴口中 口噤搗鼻法用麝金藜盧瓜蒂為末水調搗之

滯頤口角垂
延是也

聖清心導痰丸治舌縱涎下方見大人門
中用甚妙

湯小兒滯頤者多涎流出積於頤上此由脾胃冷涎多故

也脾之液為涎緣脾胃虛冷不能制其津液故流出於頤

法當溫脾按內經云古縱涎下皆屬熱此恐
其之偏見今兩存之以備香文

張渙溫脾丹 治滯頤效

白朮 青皮各半 半夏 丁香各一

乾薑炮半

右為細末糊丸如黍米大一歲兒十九二歲二十九米

飲下

臍風撮口

小兒洗浴拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是胃虛氣不和口頻撮調氣益黃散主之

赤脚金頭蜈蚣一條

蝎稍尾四條

僵蚕七條

瞿麥五分

右為末先以鷲毛管吹豆大入鼻內嚏噴啼叫可醫更

用薄荷湯下

雜方

栝蠟散治斷臍後為水濕所傷或襁抱濕氣傷於臍中或解脫風冷所乘致令小兒四肢不和臍腫多啼不能乳哺宜速療之

黃栝

釜下墨

亂髮燒各五分

右為細末每用少許傅之

○臍風濕鹽二兩豉二合杵成餅子如錢炙熱熨臍上安
又以黃栢末傳之

○姚小兒臍腫桂心炙熱熨之日四五

○秘臍風瘡用年久東壁泥研傳之

○聖臍風久者成瘡不乾伏龍肝傳之 又馬齒莧燒葉末

傳之 千金

○治小兒臍赤腫杏仁杵如脂傳臍腫上

○聖治小兒臍中汁出不止并赤腫用枯白礬研細傳之

○世治嬰兒因剪臍傷外風致瘡不乾用白礬煨白龍骨各

等分同爲末每用少許傳之 又方綿燒灰研細每少許

乾摻之

○聖撮口夜合花枝煮汁拭口并洗愈

○聖撮口治法用白殭蚕爲末蜜調塗兒穀道又牛黃一錢

竹瀝一合時時抹口中即瘥

圖小兒初生一七日內忽患臍風撮口百無一效坐視其死良可憫也有一法世罕知者凡患此證看兒齒齦上有小泡子如粟米狀以溫水蘸熟帛裹指輕輕擦破即開口便安不藥神效

針灸小兒初生臍風撮口諸藥不效者灸然谷穴在內踝前起大骨下陷中可灸三壯鍼入三分不宜見血立效

甲臍風目上插刺絲竹空

明臍腫 腰對臍骨節間三壯

乙臍風撮口在百日內不治

診